

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B100TSH0110005
Konu : DaBT-IPA-Hib Aşısı (Beşli aşı)

0 0 4 5 9 0 4 .01.08

VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

07.12.2007 tarihinde yapılan Bağışıklama Danışma Kurulu'nda DaBT-IPA-Hib (Difteri, asellüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio ve Hemofilüs influenza tip b) beşli kombine aşının uygulanma takvimi belirlenmiştir. Lojistik hazırlıklar tamamlanmış ve beşli aşının illere sevkiyatına 02.01.2008 tarihinde başlanılmıştır.

DaBT-IPA-Hib beşli aşısı 2., 4. ve 6. ay bitiminde birer doz, 18-24 aylar arasında bir kez rapel olmak üzere 4 kez uygulanacaktır. DaBT-IPA-Hib aşısının 1. dozu ile 2. dozu ve 2. dozu ile 3. dozu arasında en az dört hafta, 3. doz ile rapel doz arasında en az 12 ay süre bırakılmalıdır. Daha önce yapılan boğmaca aşısının tipine bakılmaksızın aşı dozlarına kalındığı yerden aşı şemasına uygun olarak beşli aşı ile devam edilecektir.

DBT aşısı ve Hib aşısının 2. 3. 4. ve 16-24 aylardaki uygulaması durdurulmuştur. İlk bir veya birkaç dozu DBT ve/veya Hib aşısı olarak yapılan çocuklarımızın aşılmasına beşli aşı ile devam edilecektir. Daha önceden bir aylık ara gözetilerek verilen aşı randevularına uygun olarak müracaat eden çocukların aşıları beşli aşı olarak yapılacak, bir sonraki doz için randevu verilirken yeni aralıklara (2 ay) dikkat edilecektir. Daha önce Hib aşısı yapılmayan çocuklarımıza yönelik bir yakalama kampanyası planlanmakta olup hazırlıklar devam etmektedir.

Oral Polio Aşısı ise bebeklik döneminde 6. ayda beşli aşının üçüncü dozu ile birlikte ve 18-24. aylar arasında rapel aşılması ile birlikte yapılacak ve ilköğretim birinci sınıf okul aşılması da devam edecektir.

Yeni Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi, aşının uygulama şekli ve kontrendikasyonları ile ilgili bilgi notu yazımız ekindedir. Konuyla ilgili olan 30.11.2006 tarihli ve 18607 sayılı (2006/120) Genişletilmiş Bağışıklama Programı Daimi Genelgesi ve Aşı Sonrası istenmeyen Etkiler Daimi Genelgesi yenilenerek en kısa sürede ilinize gönderilecektir. Ayrıca TSİM ve AHBS kayıt-bildirim sistemi yeni duruma göre uyarlanacaktır. Yeni kayıt-bildirim sistemine göre aşı kartı ve formların basımı il kaynaklarından temin edilecektir.

Sahaya aşı dağıtılırken, kurumdaki mevcut açılmamış DBT aşılama Sağlık Müdürlüğü soğuk hava deposuna toplatılacak, açılmış flakonlar imha edilecek, kurumlar kendilerine beşli aşı ulaşır ulaşmaz uygulamaya beşli aşı ile devam edeceklerdir.

Bilgilerinizi ve bu önemli konunun ilinizde görevli ilgili tüm sağlık personeline imza karşılığı tebliğ edilmesi ve ilinizdeki ilk uygulamanın Sayın Valilerimizin de katılımı ile basın önünde kamuoyuna duyurularak yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Uz.Dr. Turan BUZGAN
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

Ek: Bilgi notu (3 sayfa)
DAĞITIM: 81 İl Valiliğine

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BİLGİ NOTU

Konu: DaBT-IPA-Hib Aşısı (Beşli aşı)'nın kullanıma sunulması

Tek dozlu flakonlarda gönderilen DaBT-IPA-Hib aşısı sulandırıldıktan sonra bekletilmeden hemen kullanılmalıdır.

Tek dozlu kombine aşılarda sulandırılması:

- o DaBT-IPA-Hib; Difteri, asellüler (hücresiz) Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b içeren beşli kombine aşı aynı paket içerisinde DaBT ve IPA enjektör içinde sıvı formda ve liyofilize Hib içeren flakon ihtiva etmektedir. Liyofilize Hib aşısı sıvı formda olan DaBT-IPA ile sulandırıldıktan sonra hemen uygulanmalıdır.
- o Aşılama işlemi sonrası enjektör ve iğnesi güvenli atık kutusuna atılmalıdır.

Genel Aşı Kontrendikasyonları:

Genel aşı kontrendikasyonları DaBT-IPA-Hib aşısı için de geçerlidir. Aşı uygulamasında aşılarda yapılmaması gereken durumlar çok nadirdir.

- Bir aşıya karşı gelişen anaflaktik reaksiyon, o aşının sonraki dozları için kesin kontrendikasyon oluşturur.
- Bir aşı komponentine karşı gelişen anaflaktik reaksiyon, bu maddeyi içeren aşılarda için kesin kontrendikasyon oluşturur.
- Ateşli veya ateşsiz ciddi hastalık durumunda izleyen hekimine danışılmadan aşı uygulanmaz.

DaBT aşısı:

- Kesin kontrendikasyon:
 - o DaBT'ye bağlı ensefalopati (Boğmaca bileşeni çıkarılarak takvime devam edilir.)
- Önlem alınarak aşı yapılacak durumlar:
 - o Aşılamadan sonra 48 saat içinde ortaya çıkan 40,5°C ve üzerinde rektal ateş
 - o Hipotonik hiporesponsif atak
 - o Konvülsiyon
 - o Aşılamadan 48 saat sonra ortaya çıkan ve en az 3 saat süren durdurulamayan ağlama

IPA:

- Kesin kontrendikasyon:
 - o Neomisin, streptomisin veya polimiksin B'ye karşı anaflaktik reaksiyon
- Önlem alınarak aşı yapılacak durumlar:
 - o Gebelik

Hib aşısı:

- Kesin kontrendikasyon:
 - o Yoktur
- Önlem alınarak aşı yapılacak durumlar:
 - o Yoktur

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

DaBT-IPA-Hib aşısı uygulaması:

- 12 aya kadar bebeklerde deltoid kası radial sinirin yüzeysel yerleşimi ve kasın aşığı uygun şekilde absorbe edecek kadar gelişmiş olmaması nedeniyle güvenli intramuskuler (IM) uygulama için uygun değildir. Dolayısıyla bebeklerde IM uygulama için uyluğun orta veya üst 1/3 kısmında, vastus lateralis kasının ön yan bölümü kullanılır.
- 12 aydan sonra, kol üst kısmına deltoid kasa yapılır. Kol dirsekten, bacak dizden 45° içe bükülür ve enjektör 90° dik açıyla cilde girerek, kas içine (intramuskuler) uygulanır.
- DaBT-IPV-Hib içeren beşli aşı 0.5 ml uygulanır.

DaBT-IPA-Hib aşısının saklanması:

İl deposunda: Aşı flakonları (+2)-(+8)°C'de saklanmalıdır, kesinlikle dondurulmamalıdır.

Sağlık Kurumunda: DaBT-IPA-Hib aşısı buzdolabının orta rafında saklanmalıdır, kesinlikle dondurulmamalıdır. Aşı depolama kapasitesi ihtiyacındaki artış dikkate alınarak mevcut alt yapı İl Aşı Sorumlusu ve İl Soğuk Zincir Sorumlusu tarafından yerinde değerlendirilmeli ve ihtiyaç olan kurumlarda geniş kapasiteli, çift kapılı, no-frost buzdolapları acilen temin edilmelidir.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ

	Doğumda	1- ayın sonu	2. ayın sonu	4. ayın sonu	6. ayın sonu	12. ay	18-24 ay	İlköğretim 1. sınıf	İlköğretim 8. sınıf
Hep B	I	II			III				
BCG			I						
DaBT-IPA-Hib			I	II	III		Rapel		
KKK						I		Rapel	
OPA					X		X	X	
Td								X	X

Hep B: Hepatit B aşısı

BCG: Verem aşısı

DaBT-IPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b aşısı

KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı

OPA; Orai Polio aşısı

Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz aşısı

Rapel: Pekiştirme dozu